

今年第一季 42 人新興毒品致死

新冠肺炎疫情變幻莫測，年輕人卻悄悄被新興毒品毒害！台灣高檢署 6 日統計指出，今年 1 至 3 月已有 42 人因吸食新興毒品死亡，其中施用超級搖頭丸 (PMMA) 死亡高達 31 人，遠高於新冠肺炎。為遏阻毒害，檢警擬將非工業用途的 PMMA 化工原料，提報列管四級毒品，加強查緝。

近年新興毒品致死人數統計

| | 第一季 | 第二季 | 第三季 | 第四季 | 總計 |
|----------------|-----|-----|-----|----------------------------|------------------|
| 2016 | 14 | 12 | 16 | 23 | 65 |
| 2017 | 41 | 23 | 26 | 10 | 100 |
| 2018 | 7 | 11 | 14 | 13 | 45 |
| 2019 | 11 | 14 | 17 | 42 (其中PMMA死亡34人，光12月就有28人) | 84 |
| 2020 (統計僅到第一季) | 42 | | | | 42 (其中PMMA死亡31人) |

資料來源：法務部法醫研究所 製表：陳志賢

超級搖頭丸 化工原料擬列管

高檢署昨指出，由於 PMMA (副甲氧基甲基安非他命) 在年輕族群流行，不少人甚至合併「笑氣」使用，致死率近 100%，檢警因暑假將至，擔心年輕人遭毒害，近日將專案查緝。警政署則表示，PMMA 致死案一律列管溯源，初步查出，有北部黑幫涉嫌製毒。

緝毒專責檢察官指出，施用新興毒品比被毒蛇咬還恐怖，毒蛇種類有限，可用血清治療，但混用毒品有如賭命，根本沒藥醫。現國際

通報的化學合成毒物，短短 4 年間，已從 251 種暴增逾 700 種，遠超過我國檢驗管制能量。

農曆年前，高檢署就曾示警，指法醫研究所在去年第 4 季 10 至 12 月解剖吸毒致死案例，吸食 PMMA 死亡高達 34 人，光是 12 月的 1 個月內就死 28 人，案例遍及全國，以桃園最多，最年輕死者僅 17 歲。

合成毒物暴增 混合施用要命

檢警加強肅毒，但毒害未受控制。今年第一季統計顯示，新興毒品致死 42 人中，施用 PMMA 死亡仍高達 31 人，案件量居高不下，顯示毒害未獲控制。

高檢署說，近年新興毒品快速竄起，以毒咖啡包、液態毒品等混合式毒品正在年輕族群流行，因包裝精美讓人降低警戒性，因性質不定、查緝不易、混合施用後致死率高。尤其搖頭丸、安非他命、K 他命等毒品還與笑氣合併施用，更應積極壓制，防止擴散。

高檢署說，PMMA 為二級毒品，屬中樞神經興奮劑，但毒性超過搖頭丸、甲基安非他命 4 倍，50 毫克就有中毒可能。但因其毒性作用較慢，施用者常因初期無感，使用過量致死，加上成本低、製程快，常以毒咖啡包出現。吸食後會神智不清、抽搐，甚至大吼大叫。經常混入咖啡包以流行圖標吸引青少年購買；由於作用較慢，食用者易低估其藥性，導致食用過多產生心跳加速、體溫升高，最後熱衰竭身亡，致死率極高。。

據高檢署統計，今年 1 至 3 月查獲毒品 544.2 公斤，新興毒品就有 447.7 公斤，合計超過 8 成。

（資料來源：中國時報）